

Avertissements agricoles



Bulletin n° 24 du 17 septembre 1986

Numérotation continue : n° 24

COLZA :

. Grosses altises : captures et dégâts faibles


CEREALES :

. Période de semis, surveillez les limaces


COLZA :**- Grosses altises**

Les nombreux colzas semés durant la 2ème quinzaine d'août sont au stade 1 à 2 feuilles.

Les grosses altises piégées en cuvette jaune sont peu nombreuses et les morsures observées sur cotylédons ou jeunes feuilles de faible importance (les altises perforent souvent l'intérieur du limbe, alors que les limaces dévorent toujours l'extérieur des feuilles).



LA GROSSE ALTISE
(gros 21 X)



Perforation du cotylédon

DÉGÂTS SUR COTYLEDONS

Attendre pour intervenir, mais continuez à surveiller régulièrement l'arrivée de l'insecte dans votre cuvette jaune. Nous vous rappelons qu'une intervention se justifie si plus de 3 pieds sur 10 présentent des morsures jusqu'au stade 3 feuilles du colza.

Imprimerie de la Station de ~~XXXXXX~~ NANCY
Directeur-Gérant ~~XXXXXX~~ D. VERBEKE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Publication Périodique :

CPPAP N° ~~XXXXXX~~ 2011 AD
Abonnement annuel ~~XXXXXX~~ 150 F

Cité Administrative
54043 NANCY CEDEX
Tél : (8) 337.26.45.

737



Nota : Les parcelles traitées au semis avec un insecticide du sol (COUNTER, CURATER, ONCOL, DELTANET, DACAMOX) sont protégées et une application sur le feuillage est totalement inutile.

- Repousses de céréales :

Quelques parcelles (rares cette année) peuvent être envahies **précocement** et **massivement** par des repousses de céréales alors que la culture est encore au stade cotylédonaire ou à 1 à 2 feuilles. La concurrence des graminées pouvant être très préjudiciable au colza, il est conseillé, dans ces conditions, d'intervenir très rapidement avec un antigraminée strict à action foliaire :


FERVIN	0,75 à 1 kg + 2 à 3 l huile Schering
FERVINAL	1,5 à 2 l + 2 à 3 l huile Schering
FUSILADE X 2	0,5 l + Agral (0,1 % du volume de bouillie)
GALLANT	0,75 à 1 l
TARGA	0,75 à 1,25 l + 2 l huile Schering.

Dans les autres situations, attendre une levée plus complète de ces repousses.

CEREALES :

- Attention aux limaces :

Vous semez ou vous n'allez pas tarder à le faire et comme pour le colza, les céréales sont très sensibles aux attaques de limaces depuis la germination jusqu'au stade 2 à 3 feuilles. Aussi, surveillez leur présence et intervenez si nécessaire comme indiqué sur notre bulletin n° 22 du 27 août.



Avant de traiter, vérifiez si le compte est bon !

Ravageur	Observation des plantes	Piégeage "cuvette jaune"
Limace	dès les premiers dégâts, du semis au stade B2	
Grosse altise adulte	3 pieds/10 avec morsures nutritionnelles, jusqu'au stade B2	20 à 30 captures cumulées après le stade B2
Grosse altise larve	2 plantes/3 attaquées	
Puceron cendré	— automne 1 plante/5 colonisée — de C1 à 3-4 semaines avant la récolte : 2 colonies/m ²	
Charançon du bourgeon terminal		notez les premières captures ; intervenez 10 à 15 jours après si le colza est au stade B3
Gros charançon de la tige	1 ponte/plante entre les stades C1 et T20	vous indique les premières arrivées vous pouvez alors aller observer
Meligèthe	— stades boutons accolés à D1 : 1 insecte par inflorescence — stades boutons séparés à E : 2 ou 3 insectes	
Charançon des siliques	stades boutons accolés à G4 : 1 insecte/plante	

Les produits de traitement

• Contre les limaces

- appâts empoisonnés sous forme granulée, épandre régulièrement le soir (25 granulés par m²)
- matières actives : mercaptodiméthur (3 à 5 kg/ha selon les spécialités commerciales)
 métaldéhyde (5 à 10 kg/ha selon les spécialités commerciales)

• Contre les insectes

Au semis		De la levée à la fin du repos hivernal		Produits utilisables (1)		A partir de la reprise de végétation			
Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Matières actives	Spécialités commerciales	Charançon de la tige	Meligèthe	Charançon des siliques	Puceron
9 kg				Benfuracarbe	Oncol 5 G				
9 kg	9 kg			Carbofuran	Curater, Delex				
12 kg				Furathiocarbe	Deltanet				
10 kg				Terbuphos	Counter plus, Counter 2 G				
9 kg				Thiofanox	Dacamox 5 G				
		0,15 l 0,1 l		Alphaméthrine	Fastac Fastac 10	0,15 l	0,2 l 0,1 l	0,2 l 0,1 l	
				Bromophos	Nexion 25, Rhodianex, } Sovinexion 25 Nexion 40		2 l 1,4 l	2 l	2 l
				Bromophos Méthyl	Nexion EC 40		1,4 l		
		0,3 l	0,3 l	Cyfluthrine	Baythroid		0,2 l		
		0,15 l		lambda Cyhalothrine	Karate	0,1 l	0,1 l	0,1 l	
		0,25 l 25 g ma/ha		Cyperméthrine	Cymbush, Kafil super Nombreuses spécialités (2)	0,25 l	0,25 l 20 g ma/ha	0,25 l	
		0,3 l		Deltaméthrine	Décis Décis Flow	0,3 l 0,3 l	0,2 l 0,2 l	0,2 l	
				Dialiphos	Torak FD, Torak FBC		1,25 l	1,25 l	
		250 g ma/ha		Endosulfan	Nombreuses spécialités	400 g ma/ha	250 g ma/ha	600 g ma/ha	
		0,5 l		Fenvalérate	Sumicidin 10		0,4 l	0,4 l	
		0,2 l		Fluvalinate	Mavrik		0,2 l		
		200 g ma/ha		Lindane	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		1,7 l		Lindane huileux	Lindex huileux, Tula 520 huileux	2,5 l	1,7 l		
		750 g ma/ha		Malathion	Nombreuses spécialités		750 g ma/ha		
		1,25 kg		Méthidathion	Ultracide 20 bouillie Ultracide 20 liquide	1,5 kg 1,5 l	1,25 kg 1,25 l		
		200 g ma/ha		Parathion Ethyl	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Parathion Méthyl	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Parathion huileux	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
				Phosalone	Zolone Flo Nombreuses spécialités		1000 g ma/ha	2,5 l 1200 g ma/ha	1,2 l
				Pyrimicarbe	Pirimor, Pirimor G				0,5 kg
				Endosulfan + Thiométon	Serk				1,5 l
		1 l		Lindane + Parathion Ethyl	Sopragam	1,5 l	1 l		
		0,75 l		Parathion Méthyl + Phosalone	Fortène	1,5 l	0,75 l		


(1) Doses en l ou kg de produit commercial par ha.

(2) La dose de matière active par hectare mentionnée correspond à la dose de matière active la plus fréquente. Avant toute utilisation, vérifier la dose de produit commercial autorisée sur l'étiquette.

P 38

RAVAGEURS DU COLZA


Cherchez-les au bon moment...



... avec la bonne méthode...

Le piégeage ou technique de la cuvette jaune

- **Mise en place des cuvettes :** dès le semis, ou au plus tard à la levée dès les premiers réchauffements ; les installer à 10 mètres de la bordure, du côté d'un ancien champ de colza ; les remplir avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. Jusqu'au stade B₂, la cuvette est enterrée, puis elle est placée à 25 cm de hauteur.
- Attention !** Le fond de la cuvette doit suivre le niveau supérieur de la végétation.



- **Surveillance :** 2 fois par semaine et tous les jours après les premières captures.
- **Insectes capturés :** grosse altise, charançon du bourgeon terminal, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

L'observation des plantes

- **Observez 50 plantes** au hasard sur l'ensemble de la parcelle.
- **Insectes :** grosse altise (larve et adulte), puceron cendré du chou, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

... et comptez-les